



# Astuces pour ENTRETENIR ET SOIGNER DES ARBRES FRUITIERS au naturel



*Chaque arbre a son caractère et ses besoins pour grandir et produire ; chaque arbre a aussi ses parasites et solutions de soin pour garder forme et force.*

*Différents en taille, odorat, forme, fruit, feuille, ... les arbres ont pourtant des points communs : bien choisi, bien planté, bien taillé, bien entretenu chacun produira ensuite les fruits que vous espérez.*

## Au départ tout est question de choix :



➔ **de l'arbre** : le porte greffe doit être adapté au climat, au sol, à l'endroit où il sera planté et à la vigueur souhaitée ;



➔ **de la variété** : résistante aux maladies ;



➔ **du lieu de la plantation** : près d'une haie, en plein champ, entouré d'autres arbres ou isolé ;



➔ **du mode de plantation** : en pot, en bordure, en pleine terre ;



➔ **de l'arrosage** : en aspersion, en goutte à goutte, en zone aride.


## QUAND PLANTER ?

« À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine ». Ce proverbe s'applique aux arbres à racines nues. Aujourd'hui, la plupart des arbres sont vendus en pot et peuvent ainsi être plantés tout au long de l'année, mais l'automne reste la meilleure saison. Attention, durant les mois les plus chauds, il faut arroser abondamment (40 à 50L/semaine par arbre).



## COMMENT NOURRIR ?

Utiliser du compost et du fumier bien décomposé ou de l'engrais organique biologique. Répartir à l'aplomb de la circonférence que forme l'extrémité des branches. En effet, c'est par le bout des racines que l'arbre s'alimente en grande partie.



## COMMENT TAILLER ?

Les jeunes arbres ont besoin d'une taille de formation. Pendant trois à quatre ans, l'accent est mis sur les charpentières (3 à 4 branches de base) pour consolider l'arbre (son squelette). En fonction de l'emplacement et de la forme souhaitée, la taille est ensuite orientée pour stimuler la fructification. Chaque arbre fruitier a ses préférences de moment de taille.



# Mieux vaut prévenir que guérir !



- Pour préserver la vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre...), ne pas labourer autour du tronc ! Du broyat et de la tonte déposés au pied de l'arbre fournissent de l'engrais vert et permettent de maintenir la terre humide.
- Pour bien passer l'hiver, on prépare le tronc avec un mélange **facile à réaliser** : 5 doses d'**argile**, 1 dose de soufre mouillable ou de cuivre (bouillie bordelaise ou oxychlorure de cuivre), 1 dose d'huile végétale. Passée au pinceau, cette pâte blanche bouche d'éventuels trous par lesquels maladies ou insectes peuvent s'incruster.



## En fin d'automne

- Badigeonner tronc et branches avec de l'huile « **traitement d'hiver** ». À base d'huile de colza, cet insecticide d'origine végétale élimine les œufs, larves et adultes de nombreux insectes hivernants : pucerons, acariens et cochenilles.



## En fin d'hiver

- Qui dit fourmis dit pucerons. Très friandes du miellat que les pucerons secrètent en suçant la sève, les fourmis les entraînent dans les branches des arbres. Le meilleur remède est une **bande de glu**, à apposer sur un carton ou un tissu fixé à 80 cm du sol.
- **La bouillie bordelaise** a une action antifongique associée à une action bactériostatique. Composée de sulfate de cuivre additionné de chaux, elle est tolérée en agriculture biologique. Mais attention à son utilisation qui doit rester modérée.



# Focus sur 5 arbres fruitiers

## LE CERISIER


- ➔ **Plantation** : en novembre, plutôt espacé, au soleil, à proximité d'un autre cerisier pour garantir une pollinisation croisée.
- ➔ **Taille** : après la récolte + juin à juillet.

### ZOOM SUR LA MOUCHE CERISE AUTOCHTONE ET « SUZUKI »



Mouche dont la femelle pond les œufs dans les jeunes fruits d'avril à juin.

- Fabriquer un piège avec une bouteille plastique contenant 1/3 de vinaigre de cidre, 1/3 d'eau, 1/3 de vin, 2 gouttes de liquide vaisselle.
- Percer des petits trous de 4 mm maximum et suspendre à l'aide d'une cordelette.



## LE POIRIER & LE POMMIER


- ➔ **Plantation** : à l'automne, tout type de sol, avec une préférence pour les sols profonds, mi-soleil mi-ombre, à un emplacement aéré.
- ➔ **Taille** : janvier à mars.

### ZOOM SUR LE CARPOCAPSE



Papillon de nuit dont la larve se nourrit de la chair des fruits. Ponte en avril.

- Intervenir durant la ponte avec un piège en carton ondulé placé vers le bas du tronc. Ecraser les larves dès qu'elles s'y abritent.
- En protection des fruits, pulvériser de l'argile blanche.



## L'ABRICOTIER & LE PÊCHER

- ➔ **Plantation** : d'octobre à avril, au soleil, à un emplacement aéré.
- ➔ **Taille** : à l'automne et au printemps ; attention, pas de taille sévère.

### ZOOM SUR LA CLOQUE DU PÊCHER



Champignon dont les spores sont présentes sur les feuilles d'un arbre déjà infecté (même très éloigné) et qui sont transportées par le vent.

- Effectuer un traitement préventif à la bouillie bordelaise avant le débourrement des bourgeons ; à répéter après la chute des feuilles à l'automne.
- Enlever les feuilles malades et les brûler. Au pied de l'arbre, planter de l'absinthe, puissant répulsif.

